

Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА

Дата рождения: 01.01.1980 (45 л.) Пол: Ж

Регистрация биоматериала: 10.01.2025

 Биоматериал: Кровь (сыворотка); Кровь с ЭДТА; Кровь
 (цитрат натрия); Кровь с ЭДТА; Кровь с фторидом натрия;
 Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3303495985

 Заказчик: "Полное наименование
 юридического лица"

Исполнитель: ООО "ДНККОМ"

Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)








ЧСС макс: 182,1;

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
Эритроцитарные параметры













Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Гемоглобин (Hb)	141,00	г/л	119 - 146
Эритроциты (RBC)	4,50	10 ¹² /л	3,66 - 4,76
Гематокрит (HCT)	42,00	%	36 - 46
Средний объем эритроцита (MCV)	93,30	фл	86,5 - 101,79
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	31,30	пг	27,23 - 33,6
Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC)	336,0	г/л	305,9 - 337,6
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-CV)	12,80	%	11,4 - 15,29
Гетерогенность эритроцитов по объему (RDW-SD)	43,80	фл	38,3 - 51,62
Нормобласты (ядросодержащие эритроциты) (NRBC)	0,00	10 ⁹ /л	0,03
Нормобласты (ядросодержащие эритроциты) (NRBC)	0,00	%	0,5
Макроциты (MacroR)	3,60	%	3,2 - 8,02
Микроциты (MicroR)	0,80	%	0,1 - 6,81

Тромбоцитарные параметры

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
------------	-----------	----------	----------------------




Тромбоциты (PLT)	267	10 ⁹ /л	
Тромбокрит (PCT)	0,24	%	
Средний объем тромбоцитов (MPV)	9,10	фл	
Гетерогенность тромбоцитов по объему (PDW)	9,6	фл	
Коэффициент числа крупных тромбоцитов (P-LCR)	17,30	%	

Лейкоцитарные параметры













Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Лейкоциты (WBC)	5,58	10 ⁹ /л	
Нейтрофилы (NEU)	2,99	10 ⁹ /л	
Эозинофилы (EOS)	0,17	10 ⁹ /л	
Базофилы (BAS)	0,04	10 ⁹ /л	
Моноциты (MON)	0,45	10 ⁹ /л	
Лимфоциты (LYM)	1,93	10 ⁹ /л	
Незрелые гранулоциты (IG)	0,02	10 ⁹ /л	
Нейтрофилы (NEU)	53,60	%	
Эозинофилы (EOS)	3,00	%	
Базофилы (BAS)	0,70	%	
Моноциты (MON)	8,10	%	
Лимфоциты (LYM)	34,60	%	




Индекс НОМА-IR

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Глюкоза	5,0	ммоль/л	
Инсулин	3,0	мкМЕ/мл	
Индекс НОМА-IR	0,67		

Тераностика 1.7 (40-64 года)

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	20,0	Ед/л	
Фосфатаза щелочная	50	Ед/л	
Витамин В12 (цианокобаламин)	500	пг/мл	
Гликированный гемоглобин (HbA1%)***	5,0	%	
Креатинин	80	мкмоль/л	
Скорость клубочковой фильтрации, СКД-EP1	76,93	мл/мин/1,73 м2	
С-реактивный белок, высокочувствительный	0,50	мг/л	
Сывороточное железо	20,0	мкмоль/л	
Тиреотропный гормон (ТТГ)	2,00	мЕд/л	
Холестерин общий	5,00	ммоль/л	
Холестерин-ЛПНП	2,00	ммоль/л	
Цинк	20,0	мкмоль/л	



Комментарии к пробе: ***Исследование уровня HbA1c выполнено методом, сертифицированным в соответствии с National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) и стандартизованным в соответствии с референсными значениями, принятыми в Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Согласно рекомендациям ВОЗ 2011 г. и клиническим рекомендациям МЗ РФ и Российской ассоциации эндокринологов «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» (2021 г.) нормальным считается уровень HbA1c =<6,0 %, уровень HbA1c >6,0 и <6,5% сам по себе не позволяет ставить какие-либо диагнозы, но не исключает возможности диагностики СД по уровню глюкозы крови.

Уровень HbA1c $\geq 6,5$ % является диагностическим критерием сахарного диабета.

Концентрация ферритина выше 400 нг/мл у мужчин (от 16 лет) и выше 200 нг/мл у женщин (от 16 лет) может свидетельствовать о возможном риске перегрузки железом.

*Результат исследования AFP не является критерием для постановки диагноза, используется для определения группы риска развития онкозаболеваний.

Холестерин ЛПНП: уровень < 3.0 ммоль/л для взрослых и < 2.85 для детей и подростков является оптимальным для пациентов с низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Целевые уровни холестерина ЛПНП для пациентов групп умеренного, высокого и очень высокого риска определяются лечащим врачом.

Желательный уровень общего холестерина с позиции снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений составляет $< 5,2$ ммоль/л.

Пересчет единиц: мг/л (что соответствует мг/л D-DU (D-Dimer Unit)) = 2 мг/л FEU (Fibrinogen-Equivalent Unit)

Примечание:

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

Пример результата